

## SAJTÓHÍR

2015. április 23.

### Győr környéki békanász

**Az idei évben a kedvező időjárási viszonyok miatt viszonylag korán megkezdték a peterakást kisalföldi homokpuszta kételtű fajai. Az erdei békák már március közepén lerakták petéiket. Őket sorra követi a többi faj egészen április végéig. A petékből néhány héten belül kikelnek a lárvák, amelyek a vízben fejlődnek tovább.**

A Győr környéki homokpuszták állandó vizekben szegények, de a kisebb-nagyobb kubikgödrökben és belvízlevezető csatornáknban gazdag kételtű és hüllő fauna él. A hazánkban előforduló 18 kételtű faj közül eddig tízet sikerült kimutatni a Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ projekt területén. A térségben legnagyobb mennyiségben a barna ásóbéka és a vöröshasú unka fordul elő, de települések közelében gyakran lehet találkozni zöld varanggyal is. A ritkán szem elé kerülő fajok közé tartozik a dunai tarajos gőte.

A hüllők közül leggyakrabban a fűrgye gyíkkal és a vízisiklóval találkozhatunk. Utóbbtól sokan félnek és mérges kígyónak nézve agyonverik. Ne tegyék, mert ezzel csak a pockokat, egereket és egyéb kártevőket segítik, amelyeket a vízisikló szorgalmasan pusztít. A térségben nem fordul elő olyan hüllőfaj, amely mérgező vagy az emberre bármilyen módon veszélyt jelentene. Ha kertjében találkozik vele, akkor a legegyszerűbb békén hagyni, semmiképpen ne piszkálja bottal vagy egyéb eszközzel, mert harapni azért tud.

Gyakori, hogy a békák felfedezik a kerti tavakat, esővízgyűjtő hordókat és oda petéznek. Bár sokan félnek vagy undorodnak tőlük, talán a leghasznosabb barátaink, hiszen nagy mennyiségben fogyasztják a szúnyoglárvákat. Egy-egy béka a fejlődése során több tízezer szúnyoglárvát is elfogyaszthat.

Hasznosságuk mellett nem szabad elfeledkezni arról, hogy hazánkban minden kételtű és hüllőfaj védett!